



استفاده از محرك‌های رشد در کاهش تنفس خشکی در باغات انار

▪ موسسه تحقیقات خاک و آب^۱

▪ بیان مسئله


ایران کشوری با آب و هوای خشک و نیمه خشک با منابع آبی ناکافی است که در آن غالباً محصولات باقی در معرض انواع تنفس‌ها به ویژه تنفس خشکی قرار دارند. محصول انار با سطح زیرکشت ۸۹ هزار هکتار و تولید ۱/۱۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از محصولات مهم با غبانی کشور می‌باشد که نقش مهمی در رورود ارز به کشور دارد. غالباً سطح زیرکشت انار در مناطق خشک و نیمه خشک کشور می‌باشد، به طوری که اغلب درختان انار در معرض تنفس خشکی قرار دارند. استان‌های قم، فارس، مرکزی و یزد جزو مناطقی با بالاترین سطح تولید و کاشت انار محسوب می‌شوند. متوسط عملکرد درختان انار در این استان‌ها ۱۲ تن در هکتار می‌باشد. در باغات تحت این آزمایش در استان‌های قم، فارس، مرکزی و یزد عملکرد درختان انار به ترتیب ۱۸، ۵۴، ۴ و ۵/۷ تن در هکتار بود و در این آزمایش به ترتیب به ۶/۶، ۲۳، ۷۲ و ۹/۳ تن در هکتار افزایش یافت. دلیل عملکرد پایین باغات انار استان‌های یزد و مرکزی سن پایین درختان بود. هرچند درخت انار به شرایط کم آبی مقاوم است اما مقدار آب آبیاری برای درختان انار عامل تعیین‌کننده در میزان عملکرد و کیفیت میوه آن می‌باشد. تحقیقات انجام شده در ایران نشان می‌دهد که عملکرد میوه انار در اثر تنفس رطب‌بی‌تی به میزان ۳۵-۳۰ درصد کاهش می‌یابد و منجر به ترکیدگی میوه و کاهش بازاری‌سندی آن می‌شود. یکی از روش‌های سازگاری درخت انار با شرایط خشکی، مدیریت تغذیه گیاه توسط ترکیبات شیمیایی و آلی به منظور بالا بردن تحمل گیاه در مقابله با تنفس خشکی است. کاربرد ترکیبات آلی از جمله مواد محرك رشد گیاهی سازگار با محیط زیست بوده و می‌تواند به عنوان مکمل مناسب کودهای شیمیایی در این شرایط مؤثر واقع شود.

▪ معرفی دستاوردها

آزمایش‌ها در سطح ۳۰۰۰ مترمربع باغات انار انجام شد. محرك‌های رشد اسید‌آمینه، اسید فولویک، اسید هیومیک، عصاره جلبک دریایی به صورت جداگانه و یک تیمار هم به صورت ترکیبی مصرف شدند. با بررسی عملکرد میوه

۱- محمد رضا نائینی، جواد قدیبکلو، محمد زارع مهرجردی، ابوالفتح مرادی، محمد مهدی طهرانی، لیلا رضاخانی، محمد هادی میرزاپور و علی اصغر عطاریان فر

درختان انار ۱۵-۲۰ ساله مناطق قم، فارس، مرکزی و یزد تحت عامل اصلی آبیاری براساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی و ۷۰ درصد مقدار محاسبه شده براساس طراحی سیستم آبیاری و عامل فرعی کاربرد مواد محرك رشد (اسید آمینه، اسید فولویک، اسید هیومیک، عصاره جلبک دریایی و ترکیب آن ها در مقادیر و روش های مصرف متفاوت (کود آبیاری و محلول پاشی) مشخص شد که اعمال تنفس شدید خشکی (۷۰ درصد آبیاری)، عملکرد میوه درخت انار را به مقدار ۳۷ درصد نسبت به شرایط عدم تنفس کاهش می دهد. در شرایط تنفس خشکی شدید، کاربرد مواد محرك رشد به ویژه جلبک دریایی موجب افزایش عملکرد میوه درخت انار نسبت به عدم کاربرد مواد محرك رشد می شود. در استان قم مصرف عصاره جلبک دریایی در شرایط تنفس خشکی و بدون تنفس باعث افزایش عملکرد به ترتیب به میزان ۳۷ و ۴ درصد نسبت به شاهد (بدون مصرف مواد محرك رشد) شد، در استان مرکزی مصرف عصاره جلبک دریایی در شرایط تنفس خشکی و بدون تنفس باعث افزایش عملکرد به ترتیب به میزان ۳۹ و ۳۸/۷ درصد نسبت به شاهد (بدون مصرف مواد محرك رشد) شد، در استان فارس مصرف ترکیبی مواد محرك رشد (اسید هیومیک، اسید آمینه، عصاره جلبک و قارچ مایکوریزا) در شرایط تنفس خشکی و بدون تنفس باعث افزایش عملکرد به ترتیب به میزان ۲۹ و ۲۲ درصد نسبت به شاهد (بدون مصرف مواد محرك رشد) شد و در استان یزد مصرف مصرف ترکیبی مواد محرك رشد در شرایط تنفس خشکی و بدون تنفس باعث افزایش عملکرد به ترتیب به میزان ۹۸ و ۶۸ درصد نسبت به شاهد (بدون مصرف مواد محرك رشد) شد. نکته قابل توجه این است که کاربرد جلبک دریایی نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد محرك رشد) توانست اثر تنفس خشکی را خنثی کند. از این رو در شرایط تنفس خشکی دو



نمودار ۱ - عملکرد میوه (کیلوگرم در درخت)

نوبت محلول پاشی عصاره جلبک دریایی با غلظت ۵ در هزار (مرحله اول در زمان شروع بسته شدن میوه و مرحله دوم در زمان گردوبی شدن میوه) در استان های قم و مرکزی و مصرف ترکیبی مواد محرك رشد (اسید هیومیک، اسید آمینه، عصاره جلبک و قارچ مایکوریزا) در استان های فارس و یزد برای افزایش عملکرد محصول انار قابل توصیه می باشد.

پتانسیل اقتصادی و اثربخشی

۱ افزایش ۴۰-۶۰ درصدی عملکرد میوه درخت انار با دو نوبت محلول پاشی عصاره جلبک دریایی با غلظت ۵ در هزار در منطقه قم و ساوه و کاربرد ترکیبی مواد محرك رشد در منطقه فارس در شرایط تنفس شدید خشکی

۲ صرفه اقتصادی کاربرد عصاره جلبک دریایی در افزایش عملکرد میوه درختان انار تحت تنفس شدید خشکی

۳ تعديل اثر تنفس شدید خشکی به مقدار ۳۱ درصد با کاربرد مواد محرك رشد در باغات انار منطقه ساوه

۴ مصرف مواد محرك رشد در شرایط تنفس خشکی عملکرد درختان انار ۱/۷ تن در هکتار نسبت به شاهد درآمد باغدار را به میزان ۱۴۲ میلیون تومان در هکتار افزایش خواهد داد، که چنانچه هزینه خرید و مصرف مواد محرك رشد به مبلغ ۳۵ میلیون تومان در هکتار از آن کسر گردد مبلغ ۱۰/۷ میلیون تومان سود خالص عاید باغدار خواهد شد.